

## Glossário

Ana Cristina Teixeira Bonecker  
Claudia Akemi Pereira Namiki  
Márcia Salustiano de Castro  
Paula Nepomuceno Campos

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

BONECKER, ACT., *et al.* Glossário. In *Catalogo dos estágios iniciais de desenvolvimento dos peixes da bacia de Campos* [online]. Curitiba: Sociedade Brasileira de Zoologia, 2014, pp. 285. Zoologia: guias e manuais de identificação series. ISBN 978-85-98203-10-2. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.

---



All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

# Glossário

## B

**Barbilhão** – projeção sensorial estreita que se origina na maxila inferior.

## C

**ca** – aproximadamente, cerca de.

**Cleitro** – osso alongado verticalmente localizado na junção da cabeça com o tronco do peixe.

**Comprimento padrão** – distância da extremidade do focinho até a margem vertical posterior da placa hipural.

**Crista parietal** – Crista localizada na cabeça na região parietal. Os ossos parietais são um par de ossos que formam a parede lateral e superior do crânio. É uma das principais características para identificação da família Scorpaenidae.

**Crista supraoccipital** – Crista óssea localizada posteriormente no topo da cabeça.

**Crista supraopercular** – crista óssea localizada sobre o opérculo (ex. Família Syngnathidae).

## D

**Distância pré-anal** – distância da extremidade do focinho até a margem posterior do ânus.

## F

**Fotóforo** – pequenos órgãos que produzem luz localizados na cabeça e no corpo de alguns grupos de peixes (ex. Família Myctophidae).

## I

**Illicium** – espinho da nadadeira dorsal, semelhante a um tentáculo, localizado no focinho da maioria dos peixes da ordem Lophiiformes.

**Istmo** – região ventral da cabeça, abaixo das brânquias, conectando as regiões abaixo da maxila inferior e cleitral.

## M

**Maxila** – ossos que formam a boca do peixe, formado pela maxila superior ou somente maxila e pela maxila inferior ou mandíbula.

**Melanóforo** – célula que contém pigmento de melanina marrom ou preto.

**Membrana embrionária** – membrana que envolve o corpo da larva durante os estágios iniciais de desenvolvimento e na qual as nadadeiras dorsal, anal e caudal se desenvolvem.

**Meninge** – membrana que cobre a região do cérebro.

**Miômero** – segmentos de músculos do corpo que ocorrem em série, aproximadamente em mesmo número que as vértebras nos indivíduos adultos.

**Miossepto** – tecido conectivo entre os miômeros adjacentes.

## N

**Nefro** – rim. O local onde o nefro termina (miômero nefrítico) é uma característica importante na identificação das leptocephali.

**Notocorda** – estrutura cartilaginosa longitudinal que suporta o eixo do corpo.

## O

**Ossos hipurais** – uma série de ossos derivados dos ossos dos espinhos hemais (espinhos medianos na superfície central do corpo da vértebra) da última vértebra que suporta os principais raios da nadadeira caudal.

## P

**Palato** – região superior interna da boca.

**Pigmentos peritoneais** – pigmentos localizados na região do corpo associada ao intestino ou a membrana do peritônio.

**Pré-opérculo** – osso anterior mais superior da cobertura das brânquias, frequentemente com uma série de espinhos.

**Pterigióforos** – elementos cartilagosos ou ósseos que formam a base da nadadeira e sustentam os raios de um peixe.

## R

**Raio occipital** – raio (suporte segmentado da nadadeira) localizado sobre o topo da cabeça (ex. Família Bregmacerotidae).

**Região gular** – região ventral da cabeça, anterior ao istmo e abaixo da maxila inferior.

**Rostro** – prolongamento do focinho, extremidade do focinho.

## S

**Sínfise da maxila** – junção ventral das maxilas.

## T

**Tecido coroide** – massa de tecido vascular primordial que apresenta várias formas e está localizado abaixo do olho. Normalmente está presente em olhos elípticos e apresenta pigmentação (ex. Myctophidae).

## V

**Vesícula gasosa** – saco cheio de gás localizado abaixo da coluna, na região abdominal.

**Vexilo** – raio dorsal anterior alongado modificado em larvas da família Carapidae.